如何用初中物理和數學解釋人造衛星繞地球運行的道理?

可嘗試這樣逐步講:

1. 釋放手中物體,物體受地心吸力作用垂直跌下。




公式:
$$y = ut + \frac{1}{2}at^2$$

初速
$$u = 0 \text{ ms}^{-1}$$
 $g = 10 \text{ms}^{-2}$

物體在 1s 下跌的高度
$$y = (0)(1) + \frac{1}{2}(10)(1)^2 = 5m$$

把物體釋放開,滴答 1s 後,物體 下 跌 了 5 m。

2. 但把物體水平拋出,物體會沿曲線的軌跡下落,跌在我們的前方。




抛出的速度越高,物體就落在越遠位置。

這個拋物線運動和垂直跌下的有甚麼分別?

我們進行以下實驗:

在檯的邊緣並排放兩個銀幣。



用手指同時把這兩個銀幣水平彈出:一個射出的速度大;另一個 則輕輕被推出,是差不多垂直跌下。


我們用耳朵去聽,聽聽哪銀幣先到達地面。

答案是 同 時 到 達。即是無論有沒有水平初速,其下跌的情況(垂直方向的運動)無異;差別的只是落地的位置。

既然垂直跌下的是"首 1s , 跌 5m"。而現在又証明了以水平拋射的和垂直跌下的同時到地,所以前者雖然是以水平拋出,仍然是"首 1s,下跌 5 m"。

换句話說,地心吸力是影響不了水平方向的運動。水平方向的運動應該只不過是沒有加速的勻速運動 (uniform motion)。

落地的位置是决定於水平發射的初速,



3. 我們居住的地球是圓的,地面不是平的。


我們向前行走,水平線就會下跌。

地球半徑 R = 6400000 m

運用畢氏定理於圖中的黃色三

角形,
$$R^2 = (R - y)^2 + x^2$$


$$R^2 = R^2 - 2Ry + y^2 + x^2$$



若果
$$y = 5 \text{ m}$$
 , $x = \sqrt{2(6400000)(5) - 5^2}$
= 8000 m

沿地面向前行 8000 m,水平線下跌 5m

4. 這樣推想:若(2)討論的拋物體(首1s,下跌5m)與(3)討論的地球表面下跌(前行8000m,水平下跌5m)配合,那拋物體下跌高度 = 水平面下跌,這豈不是物體與地面的真正高度沒有減少!是的,可以的,但要達到這樣的配合,那就要求拋物體需要在1s,前進距離8000m。這即是說物體的水平速度如果是8000ms⁻¹,那就出現上述的配合,即是物體跌也跌不到地面。上述的就是人造衛星,在地球的引力作用下圍繞地球轉行的道理。



衛星受地心吸力作用,它不斷跌 向地面。但如果這下跌的幅度與 地面的彎曲幅度完全相同,這兩 個彎曲就可互相抵消。衛星離地 面的高度就沒有實質改變。 要出現這情況,近地面的衛星的 速度就必須是 8000 ms⁻¹。 某人的每月總開支是 \$8000 , 而這人的每月收入也是 \$8000 (月光族)。所以一個月後,這人的財富沒有多了,也沒有少了。

人造衛星運行時,也受地心吸力作用,不斷跌向地面。

但衛星運行的速度,保證地面與衛星同步下跌同一幅度,是故衛星最終跌不到地面來。

同學或會問:由靜止釋放的自由落體只是首 1s,才跌 5m。以上的討論可適用於很多秒後的 1s 嗎? 可適用的,只要是衛星的速度是 8000 ms⁻¹。因為在任何時間,衛星與地面同步"下跌",即是在任何時候,衛星的速度相對地面都是水平(垂直速度在甚麼時候皆零)。

一些有趣的相關數字:

1. 比較聲速 (340 ms⁻¹),8000 ms⁻¹ 約莫是聲速的 24 倍。

近地人造衛星的速度 = 8000 ms⁻¹

= Mach 24



這個"音速 24 倍"是不容易達到的。

F-16 戰機的最高速是 Mach 2+

所以,發射衛星的火箭要那麼巨大;要盛載大量能量,才可把衛星加速推至 Mach 24。

2. 以 8000 ms⁻¹ 繞地球一圈的時間:

$$T = \frac{$$
距離 $}{$ 速度 $} = \frac{2\pi (6400000)}{8000} = 5027s = 84min $\approx 1.5 h$$

以後,當有近地 (~300 km) 衛星或繞地球太空船發射時,大家不妨留意這幾天的相關新聞報導。你不難會看見諸如"音速廿幾倍"、" 繞地一次個多小時"、"一日見到日出十幾次"等的類似報導。

吳老師 (Chiu-king Ng)

電郵: feedbackWZ@phy.hk 其中 WZ 是 23 之後的質數



